




BOLETIN INFORMATIVO DE LA PESCA ARTESANAL EN LAMBAYEQUE - DICIEMBRE 2011

Desembarque de los principales recursos pesqueros (kg) Lambayeque, Setiembre - Diciembre 2011



| Especie | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Barriete negro | | | | |
| Bagre | 3,888.0 | 2,781.0 | 4,480.0 | 1,693.0 |
| Batea | 825.0 | 1,758.0 | 1,321.0 | 45.0 |
| Bonito | | 80.0 | | |
| Caballa | | | | 10,400.0 |
| Cabinza | | | | 500.0 |
| Cabrilla | 194.0 | 502.0 | 1,655.0 | 7,432.0 |
| Cachema | 6,273.0 | 3,701.0 | 11,902.0 | 11,439.0 |
| Cangrejo violáceo | 13,837.0 | 9,579.0 | 9,530.0 | 9,558.0 |
| Chiri | 300.0 | 10.0 | 2,975.0 | 3,135.0 |
| Chita | 1,123.0 | 906.0 | 1,960.0 | 1,697.0 |
| Concha de abanico | | | | |
| Cruceta | 3,330.0 | 120.0 | | 400.0 |
| Jurel | | | | 1,875.0 |
| Lisa | 596.0 | 6,230.0 | 21,302.0 | 34,609.0 |
| Lorna | 4,245.0 | 19,179.0 | 12,035.0 | 2,100.0 |
| Machete común | | 35.0 | 25.0 | 535.0 |
| Pámpano | 565.0 | 610.0 | 70.0 | 420.0 |
| Pulpo | | | | |
| Raya | 2,675.0 | 5,399.0 | 80.0 | 19,135.0 |
| Shumbo | | | | |
| Suco | 3,063.0 | 1,922.0 | 32,712.0 | 42,229.0 |
| Tiburón zorro | | | | |
| Tollo común | 3,610.0 | 6,455.0 | 14,325.0 | 930.0 |
| Otros | 23,024.0 | 33,071.0 | 141,039.0 | 62,005.0 |
| TOTAL | 67,548.0 | 92,338.0 | 255,411.0 | 210,137.0 |



Los desembarques acumulados a Diciembre de 2011 (4 567,5 t) representan el 100,39 % de los desembarques totales del 2010 (4 549,8 t). Pimentel (92,5 t) aportó los mayores desembarques seguido de San José (54,8 t), Eten (54,3 t) y Santa Rosa (8,6 t).

El número de las zonas de pesca (31) frecuentadas por la flota pesquera artesanal aumentó con relación a las reportadas en Noviembre (21); en tanto que los viajes disminuyeron de 2542 a 1945 con relación al mismo periodo. Los mayores desembarques provinieron de la franja ubicada a 05 mn de la costa que aportó 143,6 t (2493 viajes), a 10 mn con 16,2 t (20 viajes), a 40 mn con 13,4 t (07 viajes) y a 50 mn con 10,4 t (05 viajes). En las 05 mn destacaron las zonas ubicadas frente a Bodegones (43,7 t), San José (24,4 t), La Casa (18,9 t) y Santa Rosa (13,9 t). En las 10 mn las zonas ubicadas frente a San José (8,5 t); en las 40 mn las zonas ubicadas frente a Chicama (6,6 t); mientras que en las 50 mn destacó el lado de afuera de las islas Lobos de Afuera con 10,4 t. Las franjas con menor aporte fueron las de 20 mn con 0,6 t y la de 105 mn con 3,0 t y 01 viaje realizado.

El 69,01 % de los desembarques de Pimentel estuvo compuesto por suco, lisa, palometa y caballa; el 68,95 % de los desembarques en San José estuvo constituido por raya águila, pota, lisa y suco; el 75,84 % de lo registrado en Santa Rosa estuvo constituido por suco y cachema; mientras que en Eten la lisa, palometa y cabrilla constituyeron el 65,62 % de sus desembarques.



Desembarques por arte y aparejo de pesca.- En diciembre, se emplearon 07 diferentes artes y/o aparejos de pesca, destacando por sus desembarques, la red boliche (87,5 t), además de la red cortina (77,6 t) y pinta (24,7 t, que tuvo nuevamente la influencia de la pesquería de pota). La flota bolichera se convirtió en la principal aportante a los desembarques de Pimentel (61,4 t) y Eten (18,9 t). La flota cortinera a los desembarques de San José (41,8 t) y Eten (25,9 t); mientras que la flota con nasa y a la pinta (caballitos de totora) aportaron a los desembarques de Pimentel con 7,1 y 14,5 t respectivamente. El empleo de nasa también fue importante en Eten, donde aportó con 3,4 t.

En relación a la talla media de captura, en **diciembre** se pudo determinar que esta presentó comportamientos diferentes para cada especie en relación al mes anterior, variando en el caso de cachema de 25,9 cm a 24,4 cm; mientras que para suco varió de 21,4 cm a 21,0 cm. Para lisa esta talla varió de 28,9 cm a 30,8 cm. En el caso de cachema el 80,72 % fue inferior a la talla mínima legal (27 cm); mientras que para suco y lisa el 100,00 % continuó por debajo de su talla mínima (37 cm). Durante este periodo los desembarques de lisa y suco aumentaron con relación a los del mes de noviembre (variaron de 21,3 a 34,6 ton y de 32,7 t a 42,2 ton respectivamente); mientras que en el caso de cachema varió de 11,9 a 11,4 t. En general, durante este periodo, se volvió a observar la tendencia de disminución de las tallas medias de captura de cachema (que empezó a mostrar esta tendencia desde setiembre del 2010) y de suco (venía disminuyendo desde diciembre 2010); mientras los de lisa (que venía disminuyendo desde enero 2011) presentaron tendencia de incremento.

Caballito de totora - Desembarques (kg) Setiembre - Diciembre 2011

| Lugar | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pimentel | 9,239.0 | 21,146.0 | 20,540.0 | 21,593.0 |
| Eten | 6,182.0 | 7,327.0 | 8,427.0 | 10,119.0 |
| Santa Rosa | 1,707.0 | 1,536.0 | 895.0 | 892.0 |
| San José | 200.0 | | | 340.0 |
| Total | 17,328.0 | 30,009.0 | 29,862.0 | 32,944.0 |

En **Diciembre**, los desembarques aportados por la flota de caballitos de totora aumentaron ligeramente en comparación con el mes anterior (variaron de 29 862 a 32 944 kg), siendo igualmente, superiores a los registrados en diciembre del 2009 (21 234 kg) y a los del 2010 (30 625 kg). Pimentel aportó el 65,54 %, Eten el 30,72 %, Santa Rosa el 2,70 %; mientras que San José aportó con el 1,03 % a los desembarques de esta pesquería.

Perspectivas de la pesca.- En general, en diciembre, los desembarques totales disminuyeron (de 255,4 t en noviembre a 210,1 t en diciembre). Las mayores capturas fueron aportadas por la flota bolichera mecanizada (83,0 t), seguida de las cortineras en chalana, cortinera en lancha y pinta y nasa en caballitos de totora entre otros. Los recursos demersales y costeros aportaron las mayores capturas (83,86 %), seguido de los invertibrados y pelágicos. La caballa (con bajos desembarques) fueron los principales recursos pelágicos desembarcados; en tanto que suco, lisa, palometa (en otros), raya águila, congrio y cachema lo fueron entre los demersales y costeros; la pota (en otros) y el cangrejo violáceo fueron los principales recursos invertibrados desembarcados. Cerca de la costa, en la franja de las 05 mn, se vio favorecida la pesquería de suco, lisa, palometa, congrio, cachema y cangrejo de violáceo. Asimismo la pesquería de recursos pelágicos en zonas alejadas de la costa y en los alrededores de las islas Lobos de Afuera, continuó siendo mínima. La TSM, volvió a mostrar valores menores al mes anterior, por lo que se espera que en diciembre la disponibilidad de los principales recursos de interés comercial, tenga comportamientos similares al mes actual. En este mismo contexto, habría que tener en cuenta que durante el mes anterior se registró la disminución de la intensidad y persistencia de los vientos del Sur, situación que generó mejores condiciones de pesca (por la disminución de oleajes anómalos y días con fuertes vientos); sin embargo estas mejores condiciones también generaron la dispersión de los recursos, condición reflejada en el mayor número de zonas de pesca y en una menor disponibilidad de los mismos para la flota artesanal. Todo lo anteriormente señalado, nos permite considerar la probabilidad de que en el mes siguiente los desembarques mantengan sus actuales niveles; sin embargo, hay que tener en cuenta también que estando en pleno desarrollo la estación de verano, podría esperarse la recuperación de los mismos, tal como ocurre históricamente.