



INSTITUTO DEL MAR DEL PERU

Centro Regional de Investigación Pesquera
Santa Rosa - Lambayeque.


Telefax: 418035 - Caleta Santa Rosa
Web: www.imarpe.gob.pe/chiclayo/index.htm



BOLETIN INFORMATIVO DE LA PESCA ARTESANAL EN LAMBAYEQUE - MAYO 2008

Desembarque de los principales recursos pesqueros (Kg)
Lambayeque, Febrero - Mayo 2008

Especie	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Barrilete	375,0	132 580,0	-	-
Bagre	3 468,0	135,0	2 424,0	3 987,0
Batea	277,0	489,0	1,0	445,0
Bonito	507 403,0	1 367 102,0	348 481,0	90 118,0
Caballa	196 000,0	401,0	101 500,0	-
Cabinza	300,0	-	-	10,0
Cabrilla	545,0	349,0	1 064,0	102,0
Cachema	28 126,0	12 034,0	18 293,0	1 837,0
Cangrejo violáceo	1 663,0	3 491,0	453,0	1 979,0
Chiri	15,0	1 682,0	78,0	160,0
Chita	2 022,0	573,0	3 033,0	2 397,0
Concha de abanico	-	-	-	-
Cruceta	62 355,0	18 287,0	18 555,0	1 826,0
Jurel	2,0	2,0	28 007,0	1,0
Lisa	367 305,0	14 049,0	65 543,0	24 446,0
Lorna	14 838,0	4 740,0	7 594,0	189,0
Machete común	5,0	-	-	1,0
Pámpano	240,0	518,0	199,0	558,0
Pulpo	192,0	-	300,0	305,0
Raya	6 106,0	5 664,0	5 221,0	7 503,0
Shumbo	1 000,0	18,0	-	-
Suco	46 285,0	15 507,0	53 027,0	4 453,0
Tiburón zorro	18 460,0	500,0	100,0	-
Tollo común	1 844,0	3 721,0	233,0	1 204,0
Otros	12 820,0	16 971,0	4 106,0	8 047,0
TOTAL	1 271 646,0	1 598 813,0	658 212,0	149 568,0



Los desembarques acumulados a Mayo de 2008 (4 881,8 ton) representan el 88,54 % de los desembarques totales del 2007 (5 513,8 ton).

Temperatura Superficial del Mar (TSM): La TSM presentó valores ligeramente por encima de los esperados. Esta situación está relacionada con la proyección estacional anticipada de la ESCC (corriente subsuperficial de Cronwell) y el relajamiento esporádico de los vientos del sur. La tendencia general indica la normal disminución de las temperaturas para el próximo mes. Se espera por tanto que las condiciones continúen desfavorables para la pesca de recursos pelágicos.


En mayo, Pimentel (93,7 ton) aportó los mayores desembarques seguido de San José (35,6 ton), Eten (15,2 ton), Chérrepe (4,3 ton) y Santa Rosa (0,8 ton). La flota pesquera artesanal realizó sus operaciones de pesca tanto en la zona costera como fuera de las 40 millas náuticas de la costa; sus principales áreas de pesca se ubicaron en los alrededores de las islas Lobos de Afuera (86,0 t) frente a Puerto Eten (12,0 t), Los Barrancos (10,4 t), La Casa (6,3 t), al oeste de Santa Rosa (6,3 t) y frente a La Isla (4,6 t).

En relación a la talla media de captura, en mayo, se observó que en cachema aumentó de 27,94 cm a 30,06 cm, siendo superior a la talla mínima legal (27 cm) (RM N° 209 - 2001 - PE). El suco también aumentó su talla de 28,96 cm a 39,09 cm, siendo igualmente superior a la talla mínima legal (37 cm). Los desembarques de cachema y suco mostraron una notable disminución con respecto a abril. Con relación a lisa, sus desembarques también disminuyeron considerablemente en comparación al mes anterior (de 65,5 ton a 24,4 ton); su talla media de captura aumentó (de 28,59 cm a 30,92 cm), pero continúa siendo inferior a la talla mínima legal (37 cm). Durante este mes, las tallas medias de captura de cachema, suco y lisa presentaron tendencia de incremento.

Desembarques (kg) - Chérrepe

Especie	Marzo	Abril	Mayo
Bagre	6,0	559,0	24,0
Cachema	400,0	210,0	353,0
Chita	33,0	92,0	546,0
Congrio	24,0	18,0	22,0
Lenguado	8,0	29,0	1,0
Lisa	163,0	3 065,0	1 575,0
Cangrejo	13,0	0,0	34,0
Raya	12,0	18,0	72,0
Suco	1 639,0	2 444,0	1 040,0
Tollo común	62,0	33,0	34,0
Otros	420,0	615,0	571,0
Total	2 780,0	7 083,0	4 272,0

En mayo se han registrado capturas de 4 272 kg, las mismas que muestran una importante disminución (39,69 %) con relación al mes anterior cuando se registraron 7 083 kg. La lisa (1 575 kg) y suco (1 040 kg) fueron los recursos más importantes, seguidos en menor cantidad por chita y cachema.



Caballito de totora - Desembarques (kg)

Lugar	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Pimentel	690,0	8 806,0	4 258,0	2 095,0
Eten	2 879,0	1 875,0	16 669,0	5 367,0
Santa Rosa	2 042,0	741,0	1 482,0	841,0
San José	0,0	0,0	0,0	475,0
Chérrepe	5 168,0	2 780,0	7 083,0	4 272,0
Total	10 779,0	14 202,0	29 492,0	13 050,0

Durante este mes, los desembarques procedentes de caballitos de totora disminuyeron notoriamente (de 29 492 a 13 050 kg); sin embargo, son superiores a los registrados en mayo del 2007 (6 910 kg). Pimentel aportó el 16,05 %, Eten el 41,13 %, Chérrepe el 32,74 %, Santa Rosa el 6,44 % y San José el 3,64 %.

Desembarques industriales (ton) en Puerto Malabrigo-La Libertad, Noviembre 2007 - Mayo 2008.

Mes	Anchoveta	Otros	Total
Noviembre	186 643,0	0,0	186 643,0
Diciembre	200 681,6	0,0	200 681,6
Ene-08	0,0	0,0	0,0
Febrero	0,0	0,0	0,0
Marzo	0,0	0,0	0,0
Abril	209 999,1	0,0	209 999,1
Mayo	109 167,8	0,0	109 167,8

Pto. Malabrigo.- En mayo, se han desembarcado 109 167,8 ton de anchoveta, teniendo la flota industrial de fierro el mayor aporte (93,94 %), mientras que la flota de madera aportó solo el 6,06 %. La moda varió entre 11,5 - 15,0 cm en ambas flotas y el porcentaje promedio de juveniles fue de 25 % en la flota de madera y de 22 % en la flota de fierro. Las actividades se desarrollaron en el área comprendida entre Chicama y Los Brujos.

Perspectivas de la Pesca.- Conforme a lo previsto, en mayo, el normal desarrollo de la estación de otoño a pesar de condiciones ambientales ligeramente más cálidas a lo esperado, influyó en la menor disponibilidad de los recursos originando una notoria disminución de los desembarques (de 658,2 a 149,6 ton). Esta situación fue evidente ante la disminución de los desembarques de especies como bonito, suco, lisa, jurel, cruceta y cachema, que habían registrado los mayores aportes el mes anterior. Las mayores capturas fueron aportadas por las embarcaciones bolicheras mecanizadas (88,4 t), seguidas de las cortineras en lancha, cortineras en chalana, cortina en caballitos, boliche manual y chinchorro, entre otros. Los recursos pelágicos aportaron las mayores capturas (60,25 %), seguido de los demersales y costeros y de los invertebrados, además de los mamíferos y quelonios. El bonito fue el principal recurso pelágico desembarcado; en tanto que lisa, raya águila, suco, bagre, chita, cachema y cruceta lo fueron entre los demersales y costeros; mientras que el cangrejo violáceo y pulpo lo fueron entre los invertebrados. De acuerdo a lo observado en el mes anterior, la tendencia general indica la disminución de las temperaturas dentro de los valores normales para la estación, lo cual continuaría generando condiciones desfavorables para la pesca de recursos principalmente pelágicos en el mes de junio; situación que se reflejará en sus bajas capturas. Sin embargo, el probable incremento del esfuerzo pesquero, en la segunda quincena del mes, ante la finalización de las actividades de la pesca de anchoveta podría influir en la estabilización de los desembarques mensuales totales.