




\* NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESQUERIA DE MERLUZA FEBRERO 2008


DESEMBARQUE (t) ACUMULADO DE MERLUZA POR TIPO DE FLOTA

DIA	INDUSTRIAL			TOTAL
	EAC	EAME	EME	
01 al 15 Ene	565.7	438.8		1004.5
16 al 31 Ene	536.3	826.3		1362.6
01 al 15 Feb	528.8	634.9		1163.7
16 al 23 Feb	519.3	296.4		815.7
<b>TOTAL</b>	<b>2150.0</b>	<b>2196.4</b>		<b>4346.4</b>
%	<b>49.5</b>	<b>50.5</b>		<b>100.0</b>


ZONAS DE PESCA, TALLAS Y CAPTURA (t) DE MERLUZA POR SUBÁREA




DESEMBARQUE (t) DIARIO




COMPOSICIÓN POR ESPECIES DE LAS CAPTURAS DE LA PESCA DE ARRASTRE



CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO DE MERLUZA (t/h)



MADUREZ OVARICA DE MERLUZA




\* Cifras preliminares para uso científico

**\* NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESQUERIA DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD (*Dissostichus eleginoides*).**




**FEBRERO 2008**


**ZONA DE PESCA**




**DESEMBARQUE MENSUAL**




**PRINCIPALES PUERTOS DE DESEMBARQUE**



**ESTRUCTURA POR TALLAS**



# NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESCA COMERCIAL DE LOS RECURSOS DEMERSALES EN CALLAO - FEBRERO 2008



\*Índice de abundancia (CPUE) de las principales especies demersales desembarcadas en Callao. Febrero 2008

Especies	Captura (kg)	Esfuerzo (Nº de viajes con pesca)	CPUE (kg/viaje con pesca)
Bagre	150	1	150,0
Cabrilla	46	13	3,5
Chilindrina	16	4	4,0
Suco	9	2	4,5
<b>Total</b>	<b>221</b>		

\*Cifras preliminares y sólo para uso científico


Datos Biométricos - Febrero 2008

Especie	Número Ejemplares	Media (cm)	Moda (cm)	% Juveniles
Cabrilla	33,0	34,5	37	24,7
Coco	50,0	22,8	23,0	100,0


\*Desembarques de los principales recursos demersales (t) Febrero 2007 a Febrero 2008

Especie	Feb-07	Mar-07	Abr-07	May-07	Jun-07	Jul-07	Ago-07	Set-07	Oct-07	Nov-07	Dic-07	Ene-08	Feb-08	Total
Bagre	37,835	5,425	4,600	0,270	7,809	4,543	0,248	4,322	15,629	4,043	1,950	0,030	0,150	86,854
Cabrilla	0,517	0,760	0,121	0,164	0,037	0,055	0,068	0,029	0,362	0,058	0,033	0,085	0,046	2,335
Cachema	0,072	0,029	0,009	0,009			0,014			0,002	0,004			0,139
Coco	0,385	0,014	0,014	0,011	0,007	0,002	0,018	0,015	0,010	0,069	0,022	0,005	0,009	0,581
Congrio	1,166	0,761	0,707	0,391	0,270	0,209	0,297	0,054	0,216	0,217	0,591	0,118	0,172	5,169
Chilindrina	0,108	0,145	0,057	0,052		0,062	0,012	0,050		0,036	0,011	0,004	0,016	0,553
Otros	1,679	0,292	0,300	0,289	0,165	0,176	0,345	0,285	0,435	0,966	0,109	0,207	0,197	5,445
<b>TOTAL</b>	<b>41,762</b>	<b>7,426</b>	<b>5,808</b>	<b>1,186</b>	<b>8,288</b>	<b>5,047</b>	<b>1,002</b>	<b>4,755</b>	<b>16,652</b>	<b>5,391</b>	<b>2,720</b>	<b>0,449</b>	<b>0,590</b>	<b>101,076</b>


\*Cifras preliminares y sólo para uso científico



Desembarque (t) mensual de los principales recursos demersales en Callao, 2007-2008



Principales especies desembarcadas en Callao. Febrero 2008




Desembarques (t) de los principales recursos demersales en relación a la temperatura, 2007 - 2008

### NOTA INFORMATIVA DE LA PESCA DE RECURSOS COSTEROS EN LA ZONA DE CALLAO. FEBRERO 2008

Indice de abundancia (CPUE) de las principales especies costeras desembarcadas en Callao. Febrero 2008

	Desembarque		CPUE
	kg	N° viajes	
CABINZA	20041	79	253,68
LISA	7889	76	103,80
LORNA	28020	81	345,93
MACHETE	5840	30	194,67
MISMIS	150	1	150,00
PEJERREY	2974	45	66,09
PINTADILLA	911	57	15,98


Cifras preliminares para uso científico




Distribución y concentración de especies costeras en la zona de Callao. Febrero 2008

#### DATOS BIOMETRICOS. FEBRERO 2008


Especie	N° Ejemplares	Rango	Media	Moda
Cabinza	344	17 - 28	21,9	22,0
Lisa	255	23 - 39	29,6	30,0
Lorna	1569	14 - 31	20,1	20,0
Machete	267	20 - 28	25,2	26,0
Pejerrey	402	12 - 21	16,3	16,0
Pintadilla	184	17 - 30	23,1	22,0



Especies costeras desembarcadas en la zona del Callao. Febrero 2008












Especies costeras desembarcadas en la zona del Callao. Enero 2007 - Febrero 2008



Desembarques (t) de especies costeras en relación a la temperatura superficial del mar en la zona de Callao Enero 2006 - Febrero 2008

\* ESTADÍSTICA PRELIMINAR DEL DESEMBARQUE (t) DE PECES DEMERSALES Y COSTEROS DURANTE FEBRERO 2008



NOTA: Cabinza Ic (*I. conceptionis*), Cabrilla Ph (*P. humeralis*), Cachema Ca (*C. analis*), Camote Dc (*D. conceptione*), Cazón Csp (*Carcharhinus sp.*), Chiri Pm (*P. medius*), Congr manch (*G. maculatus*), Corvina Cg (*C. gilbeti*), Diablico (*P. furcirhinus*), Lenguado Pa (*P. adspersus*), Pámpano Ss (*S. stellatus*), Ray aguila Mc (*M. chilensis*), Ray aguila Mp (*M. peruvianus*), Raya Db (*D. brevis*)

\* Cifras preliminares y sólo para uso científico