



NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PESQUERÍA PELÁGICA
Callao, 01 al 15 de Junio del 2020

FLOTA INDUSTRIAL

Desembarques (toneladas) de recursos pelágicos en el litoral peruano.
01 Enero al 15 de Junio del 2020. Flota de cerco

Especie \ Flota \ Región	Año Calendario (01 Ene. al 15 Jun. 2020)						
	Norte	Centro	N + C	Sur	Total	%	
Anchoveta	FI Acero	649 253	349 485	998 738	0	998 738	79
	FI Madera	154 993	28 687	183 680	0	183 680	15
Sub-total	804 246	378 172	1 182 417	0	1 182 417	93	
%	68	32	100	0	100	0.01	
Sardina	0	0	0	0	0	0.00	
Jurel	11 429	49 822	61 251	0	61 251	4.84	
Caballa	3 653	18 094	21 747	0	21 747	1.72	
Samasa	0	0	0	0	0	0.00	
*Otros	0	37	37	0	37	0.00	
Total	819 327	446 125	1 265 452	0	1 265 452	100	
%	65	35	100	0	100		


*Otros incluye: Múnida

Cifras preliminares

Primera Temporada de Pesca R.M.N°0147-2020-PRODUCE. Región Norte Centro.
13 de Mayo (Inicio de la primera temporada de pesca) al 15 Junio 2020.

Especie \ Flota \ Región		Norte	Centro	N+C	%
Anchoveta	FI Acero	648 954	349 485	998 439	85
	FI Madera	150 302	28 687	178 989	15
Total		799 256	378 172	1 177 427	100
%		68	32	100	
<i>CUOTA (2 413 000 de t) en la región N+C</i>				48.8%	

Cifras preliminares de uso científico



Desembarques (t) de Anchoveta según puertos provenientes de la flota de cerco de mayor escala (01 al 15 de junio del 2020)

Desembarques diarios por tipo de flota

Los desembarques en promedio por día de la flota industrial de acero fueron de 29 mil t; mientras que para la flota industrial de madera 6 mil t




Fig. 1. Desembarques diarios de anchoveta por tipo de flota del 13 de mayo al 15 de junio del 2020


Áreas de Pesca de la Flota Industrial

Durante la primera quincena de junio se continúa con la primera temporada de pesca en la región Norte Centro, la anchoveta incremento longitudinalmente en comparación con la quincena anterior, localizándose desde Punta La Negra hasta Bahía Independencia ($06^{\circ}00'S - 14^{\circ}30'$), dentro de las 30 millas náuticas en la región norte y 40 millas en la región central. Fig.2a

Las mayores capturas durante esta quincena fueron registradas por la flota industrial de acero, representando el 68 % del total de las capturas. Sin embargo este porcentaje de la flota industrial de acero, disminuyó con respecto a la quincena pasada en el que alcanzó el 91% . Fig.2b

En esta quincena el número de embarcaciones industriales de acero representó aproximadamente el 56 % del total de embarcaciones, mientras que las embarcaciones de madera alcanzó el 44 % , en comparación con la quincena pasada la flota industrial de acero disminuyó un 24 % y la flota de madera incremento 24% Fig 2c

Fig. 2a. Distribución espacial de la anchoveta proveniente de la flota industrial, en lo que va la



Primera Temporada de Pesca (13 de mayo al 15 de junio 2020)




Fig.2b. Distribución espacial de las capturas de anchoveta por tipo de flota y Áreas isoparalitorales, en lo que va la Primera Temporada de Pesca (13 de mayo al 15 de junio 2020)





Fig. 2c. Distribución espacial de la flota (Industrial e industrial de Madera) por Áreas isoparalitorales, en lo que va la Primera Temporada de Pesca (13 de mayo al 15 de junio 2020)

Otras especies


La captura incidental presente en la pesca de la anchoveta, estuvo constituida por la caballa, desde Pimentel hasta Pucusana, dentro de las 30 mn principalmente.

Fig. 3. Zonas de pesca de la caballa incidental en la pesca industrial de la anchoveta.



Estructura por tamaños Anchoveta

La anchoveta durante la primera quincena del mes de junio, presentó un rango de tallas entre 8,0 cm LT y 16,0 cm LT, con moda en 13,0 cm LT y la incidencia de juveniles fue del 15,1 %, aumentando respecto a la quincena anterior (10.8%) .



GCQ/dué/jsr/hts
 C. 02/07/2020