



**NOTA INFORMATIVA PESQUERÍA PELÁGICA
DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**

INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ

Área Funcional de Investigaciones de
Recursos Neríticos Pelágicos



FLOTA INDUSTRIAL

La R.M.N° 383-2020-PRODUCE autorizó el inicio de la segunda temporada de pesca del 2020 de anchoveta, para la región norte-centro, a partir desde el 12 de noviembre, con un Límite Máximo Total de Captura Permisible (LMTCP) de 2,78 millones de toneladas (t).

Hasta el 30 de noviembre, el desembarque total de los principales recursos pelágicos fue de 3,19 millones de t; siendo la anchoveta la especie con los mayores aportes, representando el 96,6% del total; entre otras especies registradas destacan el jurel y la caballa con el 3,5% (Tabla 1).

Tabla 1. Desembarques (toneladas) de recursos pelágicos en el litoral peruano. 01 enero al 30 de noviembre del 2020. Flota de cerco industrial.

Especie\Flota\Región		Año calendario (01 Enero al 30 Noviembre 2020)					
		Norte	Centro	N + C	Sur	Total	%
Anchoveta	Fl. Acero	1 374 936,5	1 008 589,8	2 283 526,3	0,0	2 283 526,3	74,5
	Fl. Madera	623 074,0	82 652,8	705 726,8	0,0	705 726,8	22,1
Sub - total		1 998 010,5	1 091 246,6	3 089 253,1	0,0	3 089 253,1	96,6
%		64,7	35,3	100,0	0,0	100,0	
Sardina		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jurel		11 623,9	64 014,0	75 637,9	0,0	75 637,9	2,4
Caballa		9 947,6	24 091,7	34 039,3	0,0	34 039,3	1,1
Samasa		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
*Otros		0,0	37,0	37,0	0,0	37,0	0,0
Total		2 019 582,0	1 179 385,3	3 198 967,3	0,0	3 198 967,3	100,0
%		63,1	36,9	100,0	0,0	100,0	

ANCHOVETA

DESEMBARQUES

Desde el inicio de la presente temporada de pesca hasta el 30 de noviembre, se viene desembarcando 720 142 t, lo que representó el 25,9% del LMTCP; siendo la flota industrial de acero la que mayores desembarques ha presentado (65%) y la región norte aportó el 60,2%. (Tabla 2).

Tabla 2. Segunda Temporada de Pesca de anchoveta R.M.N° 383-2020-PRODUCE. Región Norte-Centro. Del 12 al 30 de noviembre 2020.

Especie\Flota\Región		Periodo del 12 al 30 de noviembre 2020			
		Norte	Centro	N + C	%
Anchoveta	Fl. Acero	200 903,9	268 975,9	469 879,8	65,2
	Fl. Madera	232 736,3	17 526,2	250 262,6	34,8
Sub - total		433 640,2	286 502,1	720 142,4	100,0
%		60,2	39,8	100,0	
Cuota (2 768 000 t) en la región NC					25,9%

Los desembarques diarios de anchoveta durante la segunda quincena de noviembre fueron en promedio 24 mil t por la flota industrial de acero y 13 mil t por la flota industrial de madera. (Figura 1).




Figura 1. Desembarques de anchoveta según tipo de flota durante la Segunda Temporada de anchoveta del 2020.

Los principales puertos de desembarques durante la segunda quincena de noviembre fueron: Chicama con 194 mil t y Chimbote con 135 mil t (Figura 2).




Figura 2. Desembarques de anchoveta según puertos, del 16 al 30 de noviembre el 2020.

ÁREAS DE PESCA DE LA FLOTA INDUSTRIAL

Durante la segunda quincena de noviembre, en la región norte-centro, la distribución espacial de la anchoveta se localizó en 3 zonas importantes; la primera, entre Paíta y Mórrope (05°00'S – 06°30'), dentro de las 40mn, la segunda entre Pimentel y Huarmey (07°30'S – 10°00') dentro de las 70 mn, y la tercera entre Supe y San Juan de Marcona (10°30'S – 15°00'), dentro de las 50 mn (Figura 3).




Figura 3. Distribución espacial de anchoveta proveniente de la flota del 16 al 30 de noviembre del 2020

Otras especies

Especies incidentales registradas en la pesca de anchoveta fueron caballa y múnida. La caballa se localizó en tres zonas; la primera desde Punta La Negra hasta Chimbote dentro de las 50 mn, la segunda entre Supe y Huacho entre las 20 y 50 mn y la tercera entre Pisco y Bahía Independencia entre las 30 y 40 mn (Figura 4); la múnida se localizó en dos zonas; la primera desde Punta La Negra hasta Chimbote dentro de las 50mn, la segunda se localizó desde Supe hasta San Juan de Marcona dentro de las 30 mn (Figura 5).




Figura 4. Zonas de pesca de la caballa incidental en la pesca industrial de la anchoveta.




Figura 5. Zonas de pesca de la múnida incidental en la pesca industrial de la anchoveta.

ESTRUCTURA POR TAMAÑOS

ANCHOVETA

La anchoveta, en la región norte, presentó una estructura de tallas principalmente de adultos, con un rango de 9,0 cm a 16,5 cm de longitud total (LT), moda en 14,0 cm LT y la incidencia de juveniles fue del 1%. En la región central, el rango de tallas abarcó de 8,0 hasta 17,0 cm LT, con moda principal en 12,0 cm y moda secundaria en 14,0 cm LT, con mayor presencia de juveniles, con 13%. La anchoveta mostró una marcada diferencia en la estructura de tallas, en las zonas mencionadas (Figura 6).




Figura 6. Estructura de tallas de anchoveta por regiones, durante la segunda quincena de noviembre del 2020

FLOTA ARTESANAL Y/O MENOR ESCALA DE CERCO

Desembarques

Durante la segunda quincena de noviembre, se descargaron 385,2 t proveniente de la flota artesanal y/o menor escala, con un total de 149,8 t de anchoveta desembarcado principalmente en Chimbote. Entre otras especies registradas, se encontraron importantes cifras de jurel con 182,5 t, seguido por bonito con 40,0 t (Tabla 3).


Tabla 3. Desembarques (t) de recursos pelágicos según regiones (16 al 30 de noviembre 2020)

Especie\Región	Desembarque (toneladas)					
	Norte	Centro	N + C	Sur	Total	%
Anchoveta	149,8	0,0	149,8	0,0	149,8	38,8
Sardina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jurel	0,0	173,0	173,0	9,5	182,5	47,4
Caballa	0,2	12,0	12,2	0,7	12,9	4,4
Samasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bonito	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	10,4
*Otros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	150,0	225,0	375,0	10,2	385,2	100,0
%	39,0	58,4	97,4	2,6	100,0	

DISTRIBUCIÓN

La flota artesanal y menor escala operó frente a: Chimbote dentro de las 10 mn de costa, registrándose solo ejemplares adultos (Figura 7).

Figura 7. Distribución espacial de anchoveta proveniente de la flota artesanal y menor escala durante la segunda quincena de noviembre del 2020.



Cpt/dué/jsr/hts
05/12/2020