



Pucallpa - UCAYALI


INSTITUTO DEL MAR DEL PERU
RESUMEN MENSUAL DE LA PESQUERIA COMERCIAL EN PUCALLPA Y YARINACOCHA - UCAYALI
Seguimiento - Monitoreo Biológico

AÑO	MES	DIAS
2008	Diciembre	1 al 31

1. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por especies en Puerto de Pucallpa

Recursos	Dic-08		Nov-08		%Variación Dic/Nov
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	
Boquichico	10.3	7.9	9.2	7.6	12.0
Llambina	53.6	41.3	37.1	30.6	44.7
Chiochio	24.8	19.1	29.6	24.4	-16.1
Sardina	5.2	4.0	11.0	9.0	-52.3
Palometa	0.7	0.6	1.5	1.2	-50.7
Maparate	4.2	3.3	5.4	4.5	-21.6
Otros (spp)	30.9	23.8	27.5	22.7	12.5
TOTAL	129.9	100.0	121.2	100.0	7.2


Composición por especies capturadas en el Puerto de Pucallpa, Diciembre 2008



2. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por especies en Puerto de Yarinacocha

Recursos	Dic-08		Nov-08		%Variación Dic/Nov
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	
Boquichico	0.6	2.7	0.4	1.8	38
Llambina	1.7	7.9	2.0	8.7	-14
Chiochio	7.9	37.1	10.6	46.5	-25
Sardina	1.1	5.3	0.7	2.9	73
Palometa	0.1	0.3	0.0	0.1	367
Maparate	4.9	23.1	1.5	6.7	223
Otros (spp)	5.0	23.4	7.5	33.2	-34
TOTAL	21.4	100.0	22.7	100.0	-6.0

Composición por especies capturadas en el Puerto de Yarinacocha, Diciembre 2008



3. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por lugares de pesca de la flota de Pucallpa.

Lugar de pesca	Dic-08		Nov-08		%Variación Dic/Nov
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	
Abujao+Tipishca	0.3	0.23	0.6	0.50	-50.0
Tipishca Masisea					
Shanajao					
Alianza	1.3	0.99	1.4	1.16	-8.6
Runuya	12.5	9.62	8.3	6.87	49.9
Agua Negra	3.9	2.96	9.6	7.90	-59.8
Nueva Italia	3.1	2.40	14.7	12.13	-78.8
Utucuro	61.1	47.02	32.7	26.94	87.0
Utquinia			0.1	0.09	-100.0
Otros	47.8	36.78	53.8	44.42	-11.3
TOTAL	129.9	100.0	121.2	100.0	7.2

5. Indicadores de la captura-esfuerzo para los principales lugares de pesca de la flota de Pucallpa.

INDICADORES	Lugar de pesca	N° Embarc	Cap/bog	Viaje/pesca	Rend %	t/viaje	t/emb.
	Tipishca Abujao	1	2	1	15.0	0.30	0.30
	Tipishca Masisea						
	Shanajao						
	Alianza	8	18.5	10	6.9	0.13	0.16
	Runuya	15	37.5	17	33.3	0.73	0.83
	Agua Negra	10	25	13	15.4	0.30	0.39
	Nueva Italia	5	13	5	24.0	0.62	0.62
	Utucuro	36	133	53	45.9	1.15	1.70
	Utquinia						

4. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas por lugares de pesca de la flota de Yarinacocha

Lugar de pesca	Dic-08		Nov-08		%Variación Dic/Nov
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	
Yarinacocha	10.3	48.38	2.2	9.63	372.5
Calleria	0.9	4.31	0.2	0.81	397.3
Utquinia			0.2	0.77	-100.0
Shapajal			0.7	3.01	-100.0
Milagros	0.1	0.42	0.1	0.31	28.6
Tacshitea					
Chonta	2.0	9.36	2.8	12.14	-27.5
Paris	0.2	0.98	0.4	1.85	
San Francisco					
Otros	7.8	36.55	16.2	71.48	-51.9
TOTAL	21.4	100.0	22.7	100.0	-6.0

6. Indicadores de la captura-esfuerzo para los principales lugares de pesca de la flota de Yarinacocha.

INDICADORES	Lugar de pesca	N° Embarc	Cap/bog	Viaje/pesca	Rend %	t/viaje	t/emb.
	Yarinacocha	23	129	88	8.0	0.1	0.45
	Calleria	4	40	4	2.3	0.2	0.23
	Utquinia						
	Shapajal						
	Milagros	1	10	1	0.9	0.1	0.09
	Tacshitea						
	Chonta	6	85.5	9	2.3	0.2	0.33
	Paris	2	2	2	10.5	0.1	0.11
	San Francisco						

Otros	74	187	91	25.6	0.52	0.65
TOTAL	121	416	190	31.3	0.68	1.07

7. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas mensuales por aparejo de pesca de la flota de Pucallpa.







APAREJO	Dic-08		Nov-08		Esfuerzo		CPUE	
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	N° Emb.	Viaj/pesc	t/emb	t/viaje
Hondera	104.0	80.0	96.5	79.6	77	129	1.35	0.81
Trampera	25.0	19.3	22.3	18.4	44	58	0.57	0.43
Rastrera	0.9	0.7	0.5	0.4	3	3	0.30	0.30
Dorada			0.7	0.5				
Otras			1.2	1.0				
TOTAL	129.9	100.0	121.2	100.0	121	190	1.07	0.68

Otros	26	276.5	34.0	2.8	0.2	0.30
TOTAL	50	543	138	3.9	0.2	0.43




8. Captura (t) y Variación porcentual de las capturas mensuales por aparejo de pesca de la flota de Yarinacocha.





APAREJO	Dic-08		Nov-08		Esfuerzo		CPUE	
	Captura (t)	%	Captura (t)	%	N° Emb.	Viaj/pesc	t/emb	t/viaje
Hondera	14.1	66.2	8.7	38.4	22	97	0.64	0.15
Trampera	4.7	22.2	10.4	45.8	22	27	0.22	0.18
Rastrera	0.2	1.0	0.1	0.6	1	1	0.22	0.22
Anzuelos	0.0	0.0	0.4	1.6				
Otras	2.3	10.6	3.1	13.6	8	13	0.28	0.17
TOTAL	21.4	100.0	22.7	100.00	50	138	0.43	0.15

9. Aspectos biológicos (madurez sexual)



10. Aspectos biológicos (estructura de tallas)





Nota: en noviembre no hay información biométrica de palometa.

Analisis y Procesamiento de Informacion
Blgo. Jose Carlos Riofrio Quijandria

Observadores de Campo
Tco. Victor Manuel Munoz Pezo
Tco. Cecilia Rios Pizarro

Pucallpa - Ucayali

Breve comentario: Los desembarques del mes se incrementaron levemente (7,2%) respecto a noviembre; se destaca la baja disponibilidad de boquichico (7,9% de las capturas) despues de los elevados desembarques de la especie en el período de vaciante (julio, agosto y setiembre), la especie mas importante en el mes fue la llambina (41,3% de las capturas). Por su parte en Yarinacocha se observó leve decremento (6% de las capturas), siendo la especie chiochio la mas importante en las capturas del mes (37,1%). En general las capturas registradas en el 2008, evidenciaron ser mayores en el puerto de Pucallpa (85,3%) respecto al puerto de Yarinacocha (14,7%). La red hondera fue la mas empleada en Pucallpa (80,0% de las capturas) con valores de CPUE de 1,35 t/emb y 0,81 t/viaje, en el puerto de Yarinacocha destacó igualmente la red hondera (66,2% de las capturas) con valores de CPUE de 0,64 t/emb y 0,15 t/viaje. La condición reproductiva para la temporada de comienzo de lluvias determinó periodo reproductivo (fresa) en las especies sardina, llambina y maparate; menor intensidad de desoves se observó en las especies boquichico, palometa y chiochio.

Revisión: Blgo. José Wasiw G.

