



**INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ**  
**RESUMEN MENSUAL DE LA PESQUERÍA COMERCIAL EN PUCALLPA Y YARINACocha – UCAYALI**  
 Seguimiento – Monitoreo Biológico


Del 01 al 31 de Mayo de 2009

**1. Variación porcentual de las capturas (Kg) por especies monitoreadas según puertos.**


Puerto	May-09	Abr-09	% Variación
	Captura (t)	Captura (t)	
Pucallpa			
Boquichico	4.5	4.6	-0.3
Llambina	16.4	24.4	-32.9
Chiochio	6.3	23.7	-73.5
Sardina	8.2	0.9	863.7
Palometa	4.9	0.7	608.7
Maparate	3.0	2.2	35.9
Otros (spp)	20.1	11.3	77.9
<b>TOTAL</b>	<b>63.4</b>	<b>67.7</b>	<b>-6.3</b>

Puerto	May-09	Abr-09	% Variación
	Captura (t)	Captura (t)	
Yarinacocha			
Boquichico	0.5	0.8	-30.7
Llambina	2.5	2.4	4.0
Chiochio	2.9	2.9	0.1
Sardina	4.1	0.7	511.8
Palometa	1.5	0.5	183.0
Maparate	0.5	0.6	-15.7
Otros (spp)	5.5	4.9	12.5
<b>TOTAL</b>	<b>17.5</b>	<b>12.7</b>	<b>37.4</b>

Captura (%) de las especies monitoreadas en Puerto de Pucallpa




Captura (%) de las especies monitoreadas en Puerto Yarinacocha




**2. Distribución porcentual de las artes de pesca utilizados según puertos**

Distribución (%) de las capturas según artes de pesca en Pucallpa



Distribución (%) de las capturas según artes de pesca en Yarinacocha




**3. Variación porcentual e Indicadores de la Captura y Esfuerzo según puerto y tipo de embarcación**


	Desembarque (t)		% Variación	Esfuerzo	CPUE
	May-09	Abr-09	May/Abr		
Pucallpa					
Fresquera	6.1	0.4	1421.3	44.0	0.1
Congelera	57.3	67.3	-14.8	129.0	0.4
Yarinacocha					
Fresquera	9.7	6.1	60.7	125.0	0.1
Congelera	7.8	6.7	16.3	53.0	0.1

#### 4. Capturas (t) según principales lugares de pesca por puertos

Principales lugares de pesca de la flota de Pucallpa



Principales lugares de pesca de la flota de Yarinacocha




#### 5. Principales aspectos biológicos de las especies en estudio en la región Ucayali

##### a. Condición Reproductiva

MES/IGS	Sardina	Llambina	Chichio	Boquichico	Palometa	Maparate
Abr	0.17	0.44	0.28	0.19	0.11	0.44
May	0.17	0.34	0.22	0.24	0.15	0.38

##### b. Tallas



COMENTARIO: La pesquería en Puerto de Pucallpa tuvo una disminución general del 6,3% con respecto a Abril. Boquichico, llambina y chichio disminuyeron en 0,3, 32,9 y 73,5% en cambio sardina, palometa y maparate incrementaron significativamente en 863,7, 608,7 y 35,9%. En Puerto Callao el desembarque incrementó en 37,4%. Sardina y palometa en 511,8 y 183%, disminuyeron sin embargo boquichico en 30,7% y maparate en 15,7%. Los principales lugares de pesca de la flota de Pucallpa de acuerdo al aporte al desembarque fueron: Runuya (25%), Utucuro (9%), Agua Negra (8%), Chauya (6%) y Pao (5%), para la flota de Puerto Callao fueron: Yarinacocha (46%), San Antonio (20%), Calleria (6%), Sn Geronimo (4%) y Witococha (4%). La flota fresca de Pucallpa obtuvo 0,1 t/viaje y la congelera 0,4 t/viaje. La flota de Yarinacocha obtuvo 0,1 t / viaje tanto fresqueras como congeleras. Las talas media de captura se hallan por debajo de las TMM en todas las especies monitoreadas.

6. Captura (t) e indicadores de captura y esfuerzo para los principales lugares de pesca según puerto de desembarque.

Puerto Pucallpa	Captura (t)	Viajes de pesca	Cap/Bod	t/viaje	Rendimiento (%)
Runuya	16.8	25	56.0	0.7	30.0
Utucuro	5.4	6	12.0	0.9	45.0
Agua Negra	4.9	18	33.5	0.3	14.5
Chauya	4.1	11	25.5	0.4	16.2
Pao	3.4	27	53.5	0.1	6.4
Otros	28.8	86	147.0	0.3	19.6
<b>TOTAL</b>	<b>63.4</b>	<b>173</b>	<b>327.5</b>	<b>0.4</b>	<b>19.4</b>

Puerto Yarinacocha	Captura (t)	Viajes de pesca	Cap/Bod	t/viaje	Rendimiento (%)
Yarinacocha	8.1	104	154.5	0.1	5.2
San Antonio	3.4	25	32.0	0.1	10.8
Calleria	1.0	5	8.5	0.2	12.1
San Geronimo	0.8	1	1.5	0.8	50.3
Witococha	0.7	2	2.5	0.4	28.8
Otros	3.5	41	53.8	0.1	6.4
<b>TOTAL</b>	<b>17.5</b>	<b>178</b>	<b>252.8</b>	<b>0.1</b>	<b>6.9</b>